

大自然が生んだ 海からの贈り物


天然海藻ミネラル・植物活性材

西酵ケルプパウダー

海藻濃縮液葉面散布、灌水用

製品荷姿/1.5kg缶入、100g袋入×10個詰

西酵海藻エキスはカナダの北大西洋岸の冷涼で澄み切った栄養の豊かな海水の中で繁茂し育った世界的に有名な海藻アスコフィラムノドサムを原料として作られたものです。



海藻エキスパワーで
植物はいつも
生き生き元気!

果樹、野菜、水稻、たばこ、花、芝生、のり養殖などと用途が広く、種子の浸漬、葉面散布、灌水など各方面に使用できます。

pH	9-9.5	チッソ	1-2 %
有機物質	45-55 %	リン	1-2 %
アルギン酸	18-27 %	カリ	15-17 %
マンニトール	3-8 %		
ラミナリン	2-5 %		
その他の糖分	20-22 %		
微量成分		アミノ酸(蛋白質の100g中のアミノ酸の平均g数)	
イオウ	1-2 %	アラニン	3.81
マグネシウム	0.3-0.6 %	アルギニン	0.22
カルシウム	0.1-0.2 %	アスパラギン酸	5.44
ナトリウム	3-5 %	シスチン	微量
ホウソウ	100-150 PPM	グルタミン酸	7.69
鉄	150-250 PPM	グリシン	3.16
マンガン	8-12 PPM	ヒスチジン	0.42
銅	30-50 PPM	イソロイシン	1.94
亜鉛	50-80 PPM	ロイシン	4.84
モリブデン	<1 PPM	リジン	1.33
		メチオニン	1.39
		フェニルアラニン	2.82
		プロリン	4.42
		セリン	0.14
		スレオニン	1.27
		チロシン	1.80
		バリン	3.46

成分表示100g当り(この表示値は、目安です。)

使用法

希釈倍率

- ・ 定植時の根廻し水2,000~3,000倍
- ・ 葉面散布3,000~5,000倍
- ・ 風害、霜、降雪で作物が弱っている時2,000倍
- ・ 灌注・灌水10a当り 100~200g
- ・ 農薬、液肥との混合4,000~5,000倍

使用上の注意

- ・ 開封後は、なるべく早めに使い切って下さい。
- ・ 湿気の無い所に保管して下さい。

特殊肥料輸入業者届
肥料の種類:乾燥藻及びその粉末

●製造元



株式会社 西日本酵素

〒861-1113 熊本県合志市栄3415番地23
TEL.096-348-6888 FAX.096-248-8778

西酵ケルブパウダー使用方法

水 稲	<p>『育苗期』・3,000倍液を1週間に1回葉面散布</p> <p>『田植後』・3,000倍液を3回以上葉面散布(農薬混用時は5,000倍)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分けつ期に10aあたり200gを20ℓの水に溶かして水口より流す ・穂肥時に10aあたり100gを20ℓの水に溶かして水口より流す
果 菜 類	<p>『育苗期』・3,000倍液を1週間に1回葉面散布</p> <p>『定植後』・定植時に3,000倍液でドブ浸け</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定植後3,000倍液を根廻し水として施用 ・3,000倍液を1～2週間おきに葉面散布(農薬混用時は5,000倍) ・10aあたり100gもしくは2,000倍液を月に1～2回、灌水または灌注(液肥施用時に混合すると肥料の効きも良くなります)
葉 菜 類	<p>『育苗期』・3,000倍液を1週間に1回葉面散布</p> <p>『定植後』・定植時に3,000倍液でドブ浸け</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定植後3,000倍液を根廻し水として施用 ・3,000倍液を1～2週間おきに葉面散布(農薬混用時は5,000倍) ・10aあたり100gもしくは2,000倍液を月に1～2回、灌水または灌注(液肥施用時に混合すると肥料の効きも良くなります)
根 菜 類	<ul style="list-style-type: none"> ・3,000倍液を1～2週間おきに葉面散布 ・10aあたり100gもしくは2,000倍液を月に1～2回、灌水または灌注(液肥施用時に混合すると肥料の効きも良くなります)
果 樹 類	<ul style="list-style-type: none"> ・定植時に3,000倍液でドブ浸け ・定植後は3,000倍液を根廻し水として施用 ・展葉期から収穫期まで5,000倍液を月に1～2回葉面散布 ・収穫後は樹勢回復のため5,000倍液を葉面散布
花 卉 類	<p>『育苗期』・5,000倍液を1週間に1回葉面散布</p> <p>『定植後』・3,000倍液を根廻し水として施用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5,000倍液を1～2週間おきに収穫10日前まで葉面散布 ・10aあたり100gもしくは2,000倍液を月に1～2回、灌水または灌注(液肥施用時に混合すると肥料の効きも良くなります)

※注意:農薬との混合もできますが「銅剤」「石灰硫黄合剤」との混合はしないで下さい

希釈倍率表

	水量	10ℓ	20ℓ	50ℓ	100ℓ	300ℓ	500ℓ	1,000ℓ
使用量	3,000倍時	3.3g	6.6g	17g	33g	100g	167g	334g
	5,000倍時	2g	4g	10g	20g	60g	100g	200g

◎使用上の注意

- ・吸湿性が高いため、開封後は上部チャックもしくはフタをしっかり閉めるか速やかに使い切って下さい